

Arteria ma-
gnae ramio-
rum, iecur,
bilio uescula,
uentriculum,
lienem, duode-
nim et coli par-
tem accenden-
tes.

ipsum cordis^h inuolucrum quā id septo adnascitur spargens. Post commemoratas propagi-
nes magna arteria, ex elatiori sui corporis sede,ⁱ unum promit truncum, ramos in uentriculum,
iecur, bilis uesculam, lienem, omentum, & duodenum intestinum, & colon quoque ubi uen-
triculo id exporrigitur, ad hunc modum offerentem. Praesens truncus simulatq^h prodijt, ela-
tiori sede inferioris membranæ omenti suffulcitur, ac in duos magnitudine propemodum æ-
quales ramos diremptus, hūcⁱ qui gracilior paulo est dextrorsum,^h illum uerò qui modicè am-
plior uisitur sinistrorsum mittit. Dexter ramus uenæ portæ in^h glandoso corpore, quod sub
uentriculi posteriori sede huic omenti membranæ intertextum cernitur, adnexus, sursum ad
iecoris cauum contendit, in medio ductu ex humiliori ipsius sede^o furculum inferiori omen-
ti membranæ, ipsiq^h adeò colo intestino hūc deriuans. Post hunc ab elatiori parte^h sobolem
uentriculo exporrigit, quæ in posteriorem ipsius sedem qua is dorsum spectat, pauculis ramu-
lis digeritur. Ex humiliori rursus sede, dexter arteriæ ramus ad iecoris cauum tendens, duas de
nuò profert soboles.^h Vnum cum uenæ portæ ramo intestino diffundit, quod duodenum ap-
pellamus, secundum cuius mediam longitudinem & aliquousque ad ieiuni intestini initium ea
soboles porrigitur. Altera nuper commemorata paulo amplior, ad dextram fundi uentriculi
sedem retorquetur, & superiori omenti membranæ innexa, ex elatiori sede in anteriora & po-
steriora fundi uentriculi ramulos frequentī sobole spargit, perinde ac ab inferiori sua sede alias
in omenti superiorem membranam ducit. Atque hæc arteriæ cum portæ uenæ ramo hæc ex-
porrecto ad medium fundi uentriculi cessat. Quod uerò dextræ arteriæ rami adhuc superest,
postquam ab eminentiori^h duos insigniter exiles furculos bilis uesculæ transmissit, in^h ramu-
los aliquot sectum ad iecoris cauum terminatur, non admodum altè in iecoris substantiam dif-
feminatum. Sinister ramus ab arteriæ caudice prodiens, quem^h dextro modicè crassiores
esse dicebamus, inferiori quoque omenti membranæ ipsiusq^h glandoso corpori committitur,
coniungens se uenæ portæ ramo, in tot quot ille soboles digerendus. Mox enim præsens arte-
riæ ramus ab eminentiori sede^h propaginem uentriculo qua dorso innititur offert, quæ pri-
mū^h sobolem unam utrinque in mediam uentriculi sedem eius quæ dorso incumbit regio-
nis exporrigit. deinde sursum ascendens, uenæ portæ^h modo superius uentriculi orificium co-
ronæ instar appositissimè^h cingit, ramulos uentriculi corpori & graciles furculos stomachi
termino, quo is uentriculo continuatur, distribuens. Inter reliquos autem ramos^h unus secun-
dum uentriculi superiorem dextrorsum exporrectus, uentriculi humilius aditorificium, furcu-
los quoque in progressu anteriori & posteriori sedibus uentriculi depromens. Sinister arte-
riæ ramus lienem potissimum accedens, ab humiliori ipsius sede^h propaginem in inferiorem
omenti membranam diffundit, quæ paulo post exortum in duos ramos inuicem ualde didu-
ctos discinditur, numerosam arteriarum sobolem deorsum in nunc dicam omenti membra-
nam & colon intestinum propagantes. Hac edita propagine, sinister ille arteriæ ramus fini-
strorsum magis ducitur, & uenæ ipsi attentè ritu in duas diffunditur arterias: & hæc rursus in
alias tantisper dirimuntur, donec^h frequentī ramorum serie lienis cauo secundum rectam line-
am implantentur. Priusquam uerò omnes arteriæ in lienem cessent, ab humiliore parte eius quæ
demissiore lienis sedem adit, plerunque^h ramulus inferiori membranæ omenti offertur.
Deinceps ab illa arteria, quæ infimæ lienis arteriæ proxima est, priusquam hæc in lienem de-
perditur, propago pullulat, quæ superiori membrana omenti suffulta, dextrorsum ad uentri-
culi fundum contorquetur, sinistramq^h uentriculi fundi sedem perreptans, geniculatim ramu-
los anteriori & posteriori sedibus, ac dein superiori membranæ omenti soboles spargit. Item
ab alijs lienem aduentibus arterijs^h ramuli enascuntur, qui sinistram uentriculi latus illo pror-
sus modo adeunt, quo à uenis lienem petentibus propagines eodem pertinere, superius com-
memoratum est. Cæterum à magnæ arteriæ corpore, paulo inferius quàm^h truncus cuius
iam seriem absoluiimus, principium ducit, ab elatiori quoq^h corporis parte^h alia promitur ar-
teria, quæ in superiorē mesenterij sedē in plurimas soboles diffusa, uenæ portæ modo excurrit
in ieiunum, & ilium & coli intestini partē, quæ à iecoris cauo ad dextrum renem usq^h pertinet.
Post hanc inferius paululum ab utroque magnæ arteriæ latere,^o ampla educitur arteria in sui
lateris renem, quæ admodum & uena, transuersim prorepens. Hæc arteria in renes integræ ab-
sumuntur, uixq^h uenarum modo ramulos notatu dignos in^h pinguem renum tunica diffle-
minant. Insuper ab arteria sinistrū renem accedente, ac demissius plerunq^h, quàm ea quæ sini-
stro reni offertur, principium sumentē, seminalis arteria nō enascitur, sed frequentissime (ut &
dextri testis^h arteria) ab arteriæ magnæ corpore originem ducit. Aliquantulo enim humilius
quàm dextræ seminalis uenæ^h initium à caua exurgit, ab anteriori arteriæ magnæ sede semina-
lium arteriarum^h exortus pendet, quæ ipso ortu inuicem sunt conterminæ: ac dextra quidem

Precipue
mesenterij ac-
cedens arte-
ria.

Renum arte-
ria.

Seminales ar-
teriae.

cauæ uenæ corpus^h transcendens, dextræ seminali
ac ex magna peritonæi cavitare excidēs, ipsi uenæ pe-
fformet, quorum basis humilior uē sedes superiori-
tiæ & hanc proximè inuoluenti tunicæ ramos præb-
lis arteria sinistræ congreditur uenæ, & in mulierib^h
narum distributioni penitus congruit. Vt scilicet^h m-
liaq^h uasa constituat, altera autem fundum uteri imp-
ducens, & in humiliorem mesenterij sedem distribu-
num, quā à liene ad rectum usq^h intestinum prorepi-
digeritur. A posteriori autem seu inferiori magnæ a-
geniculatim^h ramuli utrinq^h ad singulas lumborum
dullam & musculos uertebris hūc adnatos excurru-
amplitudinis ductusq^h specie conueniunt, si modò^h
quum cæteris insignior multoq^h crassior sit, ac iuxta
solū musculos uertebris attenuatos accedit, uerū m-
musculos ad latera usq^h abdominis exporrigitur. H-
ne uenæ cauæ sinistro lateri succubuit, quum uerò sa-
scendens, in^h duos grandes truncos instat Y ad hum-
tus huius permutatio propter arteriæ dignitatem. C-
tur, non immeritò ipsam magis quàm uenam recon-
mum iniurijs ferendis pertinacem effici, sagax rerū
sacri initio in dorsi motibus arteria promptè lædatur
periorē esse, illamq^h hanc conscendere uoluit, ut uen-
deretur. Cæterum priusquam uenæ cum arterijs in
superarūt, uenæ arterijs superiores ueluntur: arteriæ
duntur. Rami uerò qui à magnæ arteriæ supra sacri
mis exactissimè correspondent. Si^h exiguos sortē sur-
de, quā hæc primū bipartitō scinditur deorsum du-
subeunt, hæc dorsalem medullā posterioremq^h sacri
insignes occurrerūt, ut sectionū rudes has uenas esse
anum desinentes, faculentū san guinem nonnunquā
dum & dexter huius supra os sacri factæ diuisionis
des partitur ramos, quorū^h interior^h exteriori graci-
nes, quātū^h unam rursus interiorē, alterā uerò exte-
bis. Exterior simul cum^h uena inter sacri os & ilium
transuersim exporrigitur, & frequentī utrunq^h sobo-
adeò coxendicis articulū implicat. Anterior autē in u-
rarijs & paucas admodū etiam podici soboles dispensat. I-
grandior uisitur, in humiliorem fundi uteri regionē
duntaxat insitū calorē refocillat, sed & foetus quoq^h
go præter uterū, etiā muliebrē uesciā, & uteri ceruicē
rioris rami qui binas nunc explicatas eduxit propagi-
arteriam, quæ in umbilicū fertur, admittēs. Arteria
cæ latera deorsum ductæ, ac in natis hominibus cori-
inferuntur, ipsi uē continuātur, quem modò ab inte-
dicebā. Is namq^h nō minus quàm uena ipsi attensa pu-
transit, propaginē assumit ab externo trunci ramo,
itaq^h ramus ea propagine adactus, per pubis ossis fo-
occupantes, & illos qui à pubis ossē principiū sumun-
foramen transiens. Ac quemadmodū hæc iuxta med-
ipsum furculo alteri uenæ in^h quintū femur mouenti
nē & præsens arteriæ ramus suo sine cum alia coit^h a-
tente arteria distribui non ita multo post subijciam. I-
uisionis, quam supra os sacrum fieri dicebā, per ingu-
uērō peritonæum permeat, propaginem sursum po-
minis sui lateris musculum accedens, furculos in con-